予防接種の種類とスケジュール

お子さんをVPD（ワクチンで防げる病気）から守るために、接種できる時期になったら、忘れずに早めに接種しましょう。

R8.4.1現在

	ワクチン名	種類	対象年齢	スケジュール
定期	ロタウイルス	経口生	ロタリックス 6週から24週未満	①② 出生6週から23週6日までに27日以上の間隔をあけて2回。1回目は出生14週6日
			ロタテック 6週から32週未満	①②③ 出生6週から31週6日までに27日以上の間隔をあけて3回。1回目は出生14週6日
	B型肝炎	不活化	1歳未満	①②③ 初回接種（1・2回目）は27日以上の間隔をあける 追加接種（3回目）は1回目の接種から139日以上あける
	小児用肺炎球菌	不活化	生後2か月から5歳未満	①②③ 27日以上の間隔をおいて3回 ④ 初回接種終了後６０日以上の間隔をおいて生後１２か月に至った日以降に１回
	五種混合（百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ）	不活化	生後2か月から7歳6か月未満	①②③ 20日から56日までの間隔をおいて3回 ④ 初回接種終了後、6か月から18か月までの間隔をおいて1回 【二種混合2期】11歳～13歳未満（小学6年生）で1回
	BCG（結核）	注射生	1歳未満	①
	MR（麻しん風しん混合）	注射生	1期：1歳から2歳未満 2期：小学校就学前の1年間	① 1歳を過ぎたら出来るだけ早く接種 ② 小学校入学前の１年間で接種
	水痘（水ぼうそう）	注射生	1歳から3歳未満で水痘に罹ったことがない人	① 生後12か月から生後14か月までに1回 ② 1回目の接種後、6か月から１２か月までの間隔をおく
	日本脳炎	不活化	1期：3歳から7歳6か月未満 2期：9歳から13歳未満	①②③ 【１期初回】６日から２８日までの間隔をおいて２回 【１期追加】２回目から概ね１年後 日本脳炎2期】9歳～13歳未満（小学4年生）で１回



標準的な接種期間　　定期予防接種の対象年齢

★令和8年4月1日からRSウイルスワクチン（母子免疫ワクチン）が定期接種になりました。

・「予防接種と子どもの健康」をよく読んで接種を受けてください。

・同時に複数のワクチンを接種することも可能です。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

柳川市ホームページ

問い合わせ先　柳川市健康づくり課健康係（柳川庁舎1階14番窓口）　TEL：0944-77－8536